

موارد منع مصرف

- در صورت حساسیت به این دارو، غذاها، رنگ ها، مواد نگهدارنده و ... پزشک خود را مطلع سازید.
- در صورت وجود مشکلاتی نظیر افزایش سطح پتاسیم خون ، نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی و همچنین مصرف داروهایی نظیر مدرهای نگه دارنده پتاسیم، ایتراکونازول، کتوکونازول، کلاریترومایسین، تلیترومایسین، نفازودون، ریتوناویر، نلفیناویر و مصرف همزمان داروهای مهارکننده ی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و مهارکننده های گیرنده ی آنژیوتانسین، قبل از مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید.
- چای سیاه منجر به کاهش اثر بخشی دارو میشود.
- گریپفورت منجر به افزایش احتمالی پتاسیم میشود.

دسته دارویی

آنتاگونیست گیرنده آلدسترون

طبقه بندی بالینی


ضد فشار خون

اشکال در دسترس

این دارو به صورت قرص های خوراکی روکشدار گرد زرد رنگ حاوی ۲۵ و ۵۰ میلی گرم اپلرنون در بلیسترهای ۱۰ عددی و جعبه ۳۰ عددی موجود می باشد.

موارد استفاده دارو

- فشار خون بالا
- نارسایی قلبی ناشی از انفارکتوس میوکارد



اپلرنون (Inspra)



ملیحه صحتی – کارشناس پرستاری

تابستان ۱۴۰۲

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

احتیاطات و نکات مهم

- ❖ قرص روکش دار را له ، جویده ، حل یا تقسیم نکنید.
- ❖ دارو را میتوان بدون ارتباط (همزمانی) با غذا مصرف کرد.
- ❖ قبل از مصرف دارو بهتر است فشار خون بیمار و نبض بیمار گرفته شود.
- ❖ در صورت افت فشار خون بعد از مصرف دارو بیمار را در پوزیشن شوک (خوابیده به پشت و پاها بالاتر از سطح بدن) قرار گیرد.
- ❖ از انجام کارهایی که نیازمند هوشیاری کامل میباشند و یا انجام کارهای ظریف تا زمان مشخص شدن پاسخ به دارو اجتناب کنید. (سرگیجه های احتمالی)
- ❖ از مصرف جایگزین های نمک حاوی پتاسیم اجتناب کنید.

(۴)

❖ از ورزش در هوای گرم اجتناب کنید (خطر از دست دادن آب بدن و افت فشار خون)

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر بلافاصله با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

افزایش سطح پتاسیم خون، گرفتگی عضلانی، اسهال، تهوع، سرگیجه، سردرد، افزایش کلسترول خون، بی خوابی، غش کردن، یبوست، سرفه، افت فشار خون، استفراغ، کهیر، درد، افزایش اوره و کراتینین خون، ضربان قلب نامنظم.

نکات مهم

- این دارو جهت بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری کنید.
- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان و نوجوانان به اثبات نرسیده است.

(۵)

شرایط نگهداری

- ۱- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- ۲- دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی نگهداری نمایید.
- ۳- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

منابع

- مجید متقی نژاد- فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ- ۱۴۰۰- انتشارات اندیشه رفیع
- علی اسدالهی امین -داروهای ژنریک ایران - ۱۴۰۰- انتشارات اندیشه رفیع

(۶)