

عوارض جانبی شایع

- خونریزی: مانند خونریزی بینی، کبودی یا خونریزی که طولانی شود.

- تنگی نفس غیرمنتظره در هنگام استراحت: ممکن است این اتفاق در چند هفته ابتدایی مصرف تیکاگرلور رخ دهد و معمولاً خفیف است.

- درد و تورم مفاصل: این عوارض نشانه ای از نقرس است. (مصرف تیکاگرلور منجر به بالا رفتن سطح اسید اوریک در خون می شود)

- سر درد

- سرگیجه

- احساس بیماری یا سوء هاضمه

- اسهال یا یبوست

- بثورات پوستی خفیف

تیکاگرلور (Ticagrelor) با نام تجاری بریلینتا یک داروی ضد پلاکتی است. به همراه تیکاگرلور، آسپرین نیز برای شما تجویز می شود، زیرا آسپرین یکی دیگر از داروهای ضد پلاکتی است. یک دوره درمان با تیکاگرلور معمولاً تا ۱۲ ماه طول می کشد، در حالی که درمان با آسپرین به احتمال زیاد مادام العمر طول می کشد.

در خون شما، سلول های چسبنده ای به نام پلاکت وجود دارد. هنگامی که جایی از بدنتان بریده می شود، پلاکت ها به یکدیگر می چسبند تا روی زخم شما دلمه ببندد و زخم شما بسته شود. گاهی اوقات پلاکت ها داخل عروق خونی به یکدیگر می چسبند و در عروق خونی لخته ایجاد می کنند. اگر در رگ های خونی اطراف قلب، ترومبوز تشکیل شود، جریان خون به قلب کاهش می یابد.

تهیه تیکاگرلور فقط با نسخه پزشک ممکن است. این داروی ضد پلاکت و لخته شدن خون به صورت قرص یا قرص های زیر زبانی ارائه می شود

	یا من اسمم دواء و ذکره شفاء	
---	--	---

تیکاگرلور



یلدا ناظر – کارشناس پرستاری

تابستان ۱۴۰۲

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

نحوه و زمان مصرف

در زمان شروع مصرف تیکاگرلور می توان روزی یک دوز از آن را مصرف کرد.

پس از آن بیشتر افراد روزانه دو بار، صبح و شب، این دارو را جهت جلوگیری از لخته شدن خون مصرف می کنند.

می توان تیکاگرلور را به همراه غذا یا بدون آن مصرف کرد.

در صورت استفاده از قرص های زیر زبانی تیکاگرلور، آنها را در دهان گذاشته و اجازه دهید تا حل شوند. سپس محلول را با آب یا بدون آن میل کنید.

مصرف تیکاگرلور در دوران بارداری و شیردهی

مصرف تیکاگرلور در دوران بارداری یا هنگام تلاش برای بارداری توصیه نمی شود. در هنگام مصرف این داروی ضد پلاکت ، جهت پیشگیری از باردار شدن می توان از داروهای ضد بارداری استفاده کرد.

در صورتی که تمایل به بارداری دارید با پزشک مشورت کنید تا داروی مناسب دیگری را توصیه کند. در صورت شیردهی قبل از مصرف این داروی رقیق کننده خون با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت بروز عوارض زیر فوراً پزشک خود را مطلع کنید:

- مشاهده خون در سرفه، ادرار یا استفراغ

- احساس ضعف در یک طرف بدن، مشکل در گفتار یا تفکر، از دست دادن تعادل و تاری دید

احتیاط در مصرف تیکاگرلور با مصرف داروهای دیگر

قبل از شروع به مصرف این داروی ضد پلاکت، در صورت استفاده از داروهای زیر پزشک خود را مطلع کنید:

- داروهای رقیق کننده خون یا جلوگیری کننده از لخته شدن خون مانند آسپرین و وارفارین

- ریواروکسابان یا آپیکسابان

- داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) مانند ایبوپروفن

- داروهای ضد افسردگی بازدارنده بازجذب سروتونین (SSRI) مانند سیتالوپرام

- بعضی از آنتی بیوتیک ها مانند کلاریترومایسین و ریفامپیسین

- داروهای صرع مانند فنی توئین و کاربامازپین

- سیمو استاتین (Simvastatin) که برای کاهش کلسترول استفاده می شوند.

- دیگوکسین

منابع

- مجید متقی نژاد- فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ- ۱۴۰۰- انتشارات اندیشه رفیع

- علی اسدالهی امین -داروهای ژنریک ایران - ۱۴۰۰- انتشارات اندیشه رفیع