

موارد منع مصرف

- واکنش حساسیتی به داروی لابتالول
- برادیکاردی سینوسی
- بلوک قلبی
- شوک کاردیوژنیک
- آسم برونشial
- نارسایی قلبی جبران نشده
- بارداری (سه ماهه دوم و سوم)

موارد احتیاط

- نارسایی کبدی
- نارسایی قلبی
- تاکیکاردی
- برونکواسپاسم غیر آلرژیک
- دیابت

شرایط نگهداری دارو

داروی لابتالول را می توانید در دمای اتاق یا یخچال نگهداری کنید اما باید از انجماد و نور مستقیم محافظت شود.

داروی لابتالول نوعی بلوکه کننده گیرنده بتا می باشد. اما به طور انتخابی گیرنده آلفا یک آدرنرژیک را نیز مهار می کند. کاربرد لابتالول کاهش فشار خون می باشد. اشکال دارویی لابتالول به شکل قرص و تزریقی می باشد. دوز دارویی لابتالول توسط پزشک تعیین می شود و شما باید از قطع ناگهانی لابتالول اجتناب کنید. نحوه انفوزیون لابتالول و سرعت آن متفاوت می باشد.

گروه دارویی

- بتا بلاکر همراه با فعالیت آلفا بلاکر
- درمان فشار خون خفیف تا شدید همچنین شرایط اورژانسی فشارخون بالا

مقدار مصرف

مصرف خوراکی لابتالول به صورت ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز می باشد. هر ۲ تا ۳ روز یک بار می توان دوز لابتالول را ۱۰۰ میلی گرم افزایش داد. دوز معمول لابتالول ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم دو بار در روز است.

مکانیسم اثر

مکانیسم لابتالول به گونه ای است که گیرنده های آلفا، بتا یک و بتا دو آدرنرژیک را مهار و سطح رنین را کاهش می دهد.

	یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء	
---	--	---

لابتالول



معصومه مینائی – کارشناس پرستاری

تابستان ۱۴۰۲

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

نکات قابل توجه

- مصرف لابتالول در کودکان مورد تایید نیست.
- لابتالول در درمان فشار خون بالا کاربرد دارد.
- گیجی، تهوع، خستگی و یا عوارض پوستی شایع ترین عوارض لابتالول محسوب می شود.
- داروی لابتالول می تواند مجاری هوایی را تنگ کند.
- از این رو در افراد مبتلا به آسم ممنوعیت مصرف دارد.
- درمان با داروی لابتالول می تواند بر نتایج ج برخی آزمایشات تاثیر بگذارد.
- قطع ناگهانی مصرف داروی لابتالول می تواند شرایط آنژینی را تشدید کند.



تداخلات دارویی

مخدرهایی مانند فنتانیل در مصرف همزمان با داروی لابتالول سبب بروز برادیکاردی و افت فشار خون شدید می گردد.

- سایمتیدین اثرات داروی لابتالول را تشدید می کند.
- استفاده همزمان از داروی لابتالول با دiltiazem ، وراپامیل یا دیگوکسین ممکن است خطر برادیکاردی را افزایش دهد.
- نمک های آلومینوم، باربیتورات ها، کلستیرامین، پنی سیلین ها، ریفامپین، سالیسیلات ها و ضد التهاب های غیر استروئیدی اثرات بتابلاکرها و از جمله داروی لابتالول را کاهش می دهند.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات ایجاد اثرات درمانی مورد نظر، ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک معالج مشورت نمایید.

عوارض

- گیجی، خستگی، سردرد
- تهوع، استفراغ، سوء هاضمه
- ادم، افت فشار خون
- بثورات جلدی، خارش سر
- عدم نعوظ
- احتقان بینی، تنگی نفس
- افزایش ترانس آمینازهای سرم

مصرف در بارداری و شیردهی

- مصرف لابتالول در بارداری: مطالعات حیوانی در مورد تاثیر لابتالول در حاملگی شواهدی را مبنی بر تراژونیک بودن نشان داده است. داروی لابتالول می تواند از جفت عبور کرده و با چشمان جنین حیوان باند شود. احتمال بروز دپرسیون تنفسی و هایپوگلاسمی نیز گزارش شده است. اطلاعات کنترل شده ای در مورد تاثیر لابتالول در بارداری انسان در دست نیست.
- مصرف لابتالول در شیردهی: مصرف داروی لابتالول در شیردهی توصیه نمی شود. داروی لابتالول در شیر انسان ترشح می شود.

توجهات بیمار – خانواده

- دوز دارویی لابتالول باید توسط پزشک تعیین شود. در طول درمان با لابتالول از تغییر وضعیت ناگهانی اجتناب کنید.
- مصرف داروی لابتالول می تواند با یا بدون غذا باشد.
- از قطع ناگهانی لابتالول اجتناب کنید.
- در طول درمان با لابتالول فشار خون خود را به طور روزانه چک کنید.
- پیگیری های درمانی مرتبط با داروی لابتالول را مورد توجه قرار دهید.

منابع

- مجید متقی نژاد- فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ-۱۴۰۰-

انتشارات اندیشه رفیع

- علی اسدالهی امین -داروهای ژنریک ایران - ۱۴۰۰- انتشارات اندیشه